

Diabetologie und Stoffwechsel

Supplement

S2

November 2024
Seite S109–S462
19. Jahrgang

This journal is listed in
Science Citation Index,
EMBASE and SCOPUS

Offizielles Organ
der Deutschen
Diabetes Gesellschaft

DDG Deutsche
Diabetes
Gesellschaft

PRAXISEMPFEHLUNGEN DDG

CLINICAL PRACTICE RECOMMENDATIONS

**Praxisempfehlungen
der Deutschen
Diabetes Gesellschaft**

*Herausgegeben von
M. Kellerer
K. Müssig
im Auftrag der DDG*

▪ Aktualisierte Version 2024

 **Thieme**

Diabetes, Sport und Bewegung

Autorinnen/Autoren

Katrin Esefeld^{1,2}, Stephan Kress^{3,4}, Meinolf Behrens^{3,5}, Peter Zimmer⁶, Michael Stumvoll⁷, Ulrike Thurm³, Bernhard Gehr^{3,8}, Martin Halle^{1,2,3†}, Christian Brinkmann^{3,9,10†}

Institute

- 1 Präventive und Rehabilitative Sportmedizin, Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar, München, Deutschland
- 2 Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK), partner site Munich Heart Alliance (MHA), München, Deutschland
- 3 AG Diabetes, Sport und Bewegung der DDG, Berlin, Deutschland
- 4 Medizinische Klinik Vinzentius-Krankenhaus Landau, Landau, Deutschland
- 5 Diabeteszentrum Minden, Minden, Deutschland
- 6 AG Diabetes, Sport und Bewegung der DDG, Berlin, Deutschland
- 7 Medizinische Klinik und Poliklinik III, Universitätsklinik Leipzig, Leipzig, Deutschland
- 8 m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn, Bad Heilbrunn, Deutschland
- 9 Institut für Kreislauf-Forschung und Sportmedizin, Deutsche Sporthochschule Köln, Köln, Deutschland
- 10 IST Hochschule Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

Bibliografie

Diabetol Stoffwech 2024; 19: S279–S289

DOI 10.1055/a-2312-0420

ISSN 1861-9002

© 2024, Thieme. All rights reserved.

Georg Thieme Verlag KG, Oswald-Hesse-Straße 50, 70469 Stuttgart, Germany

Zitierweise für diesen Artikel Diabetol Stoffwech 2024; 19: S279–S289. DOI: 10.1055/a-2312-0420

Dieser Beitrag ist eine aktualisierte Version und ersetzt den folgenden Artikel: Esefeld K, Kress S, Behrens M et al. Diabetes, Sport und Bewegung. Diabetol Stoffwech 2023; 18: S314–S323. DOI: 10.1055/a-2076-0130

Korrespondenzadresse

Univ.-Prof. Dr. Martin Halle
Poliklinik für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin;
Universitätsklinikum rechts der Isar Technische Universität München, Georg-Brauchle-Ring 56, 80992 München, Deutschland
Martin.Halle@mri.tum.de

Dr. med. Stephan Kress
AG Diabetes, Sport und Bewegung der DDG, Berlin, Deutschland
s.kress@vinzentius.de

Prof. (FH) PD Dr. Christian Brinkmann
Institut für Kreislauf-Forschung und Sportmedizin, Abteilung Präventive und Rehabilitative Sport- und Leistungsmedizin, Am Sportpark Müngersdorf 6, 50933 Köln, Deutschland
c.brinkmann@dshs-koeln.de

Aktualisierungshinweis

Die DDG-Praxisempfehlungen werden regelmäßig zur zweiten Jahreshälfte aktualisiert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie jeweils die neueste Version lesen und zitieren.

INHALTLICHE NEUERUNGEN GEGENÜBER DER VOR-JAHRESFASSUNG

Neuerung 1: Aktualisierung der Bewegungsempfehlungen für ein optimales Bewegungspensum gemäß den Empfehlungen der American Diabetes Association (ADA) für das Jahr 2024

Begründung: Empfehlungen der neu erschienenen Guidelines der ADA 2024 werden nun berücksichtigt.

Stützende Quellenangabe: [1]

Neuerung 2: Hinweis, dass Phasen des Menstruationszyklus für Überlegungen zur Anpassungen der Insulindosis/Zusatzkohlenhydrate im Zusammenhang mit Sport als ein weiterer Faktor berücksichtigt werden sollten.

Begründung: Studien deuten an, dass Glukosedynamiken in Abhängigkeit vom Menstruationszyklus im Kontext von Sport und Bewegung unterschiedlich sein können.

Stützende Quellenangabe: [2]

Neuerung 3: Hinweis auf die Möglichkeit des Einsatzes digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) für Lebensstilmodifikationen

Begründung: DiGA auf Rezept können Menschen mit Diabetes bei Lebensstilveränderungen unterstützen, um klinische Werte zu verbessern. Für einige DiGA wurde bereits ein Wirksamkeitsnachweis erbracht.

Stützende Quellenangabe: [3]

† Diese Autorinnen/Autoren haben zu gleichen Teilen beigetragen.

Neuerung 4: Aktualisierung der Empfehlungen zum Elektromyostimulations (EMS)-Training für Menschen mit Diabetes mellitus

Begründung: Gemäß der Empfehlung eines überarbeiteten Consensus-Reports (aufgrund neuerer Studien zur Effektivität und Sicherheit von EMS-Training) gilt Diabetes mellitus nun nicht mehr als absolute, sondern relative Kontraindikation für ein EMS-Training im kommerziellen Setting.

Stützende Quellenangabe: [4]

Neuerung 5: Erläuterung zum Einsatz von „Exercise snacks“ (Bewegungseinheiten von kurzer Dauer)

Begründung: Einige Studien deuten an, dass der Einsatz sogenannter „Exercise snacks“, die sich gut in den Alltag integrieren lassen, nützlich sein könnte, um den gesundheitsschädlichen Wirkungen langer Inaktivitätsphasen entgegenzuwirken und das Glukoseprofil zu verbessern.

Stützende Quellenangabe: [5, 6]

Neuerung 6: Hinweis zum optimalen Timing von Sport und Bewegung bei Menschen mit Typ-2-Diabetes mellitus

Begründung: Eine aktuelle Metastudie zeigt, dass zur Reduktion postprandialer Glukosespitzen Sport und Bewegung zeitnah nach dem Essen sinnvoller sind als vor dem Essen.

Stützende Quellenangabe: [7]

Bewegung ist für alle Formen des Diabetes mellitus eine der wichtigsten Maßnahmen, die Gesundheit zu erhalten. Durch Sport und Bewegung werden Anpassungs- und Reparaturmechanismen in verschiedenen Organsystemen und Zellen wie der Muskulatur, den Nerven, Gefäßen, im Immunsystem oder Gehirn ausgelöst, die helfen können, Krankheiten abzuwehren [8, 9, 10, 11].

Es muss dabei keine körperliche Höchstleistung erbracht werden. Belastungen nach dem Motto „Laufen ohne Schnaufen“ bringen bereits gute Gesundheitsergebnisse. Neben gezielten Bewegungsmaßnahmen wird als effektiver Ansatz auch die Ausweitung der Chancen für Bewegung im Rahmen der Alltagsaktivitäten empfohlen. Nach den Empfehlungen der American Diabetes Association (ADA) aus dem Jahr 2024 sollen sich Erwachsene mit Diabetes 150 Minuten und mehr in moderater Intensität pro Woche bewegen. Jüngere und körperlich fitte Patienten können sich auch intensiver belasten (Mindestempfehlung: 75 Minuten/Woche). Die Bewegung sollte verteilt sein auf mindestens 3 Tage, wobei nicht mehr als 2 bewegungsarme Tage hintereinander liegen sollten. Außerdem wird empfohlen, 2- bis 3-mal pro Woche Krafttraining durchzuführen, aber nicht an aufeinanderfolgenden Tagen. Sitzphasen sollen alle 30 Minuten unterbrochen werden. Für Ältere wird 2- bis 3-mal pro Woche zusätzlich Flexibilitäts- und Gleichgewichtstraining empfohlen. Auch alternative Sportarten wie Yoga und Tai-Chi können geeignet sein. Zur Adipositasbehandlung sind Bewegungsumfänge von 200 bis 300 Minuten pro Woche und ein Energiedefizit von ca. 500 bis 750 kcal/Tag anzustreben [1]. Für Kinder und Jugendliche gilt eine Empfehlung für moderate bis anstrengende Bewegung von mindestens 60 Minuten Dauer/Tag [1].

Diese Praxisleitlinie soll die pathophysiologischen Hintergründe und therapeutischen Optionen zur Bedeutung von körperlicher Aktivität in der Therapie des Diabetes mellitus in Grundzügen umreißen und praktische Empfehlungen für die Umsetzung bei Typ-1- und Typ-2-Patienten geben.

Physiologie des muskulären Glukosestoffwechsels

Kontraktionen der peripheren Skelettmuskulatur erhöhen den muskulären Energieverbrauch. In Abhängigkeit von der Belastungsintensität und -dauer kann dieser auf das 8- bis 10-Fache des Ruhebedarfs ansteigen. Wird der Energieverbrauch unter Ruhebedingungen primär durch die Oxidation freier Fettsäuren gedeckt, so wird unter körperlicher Belastung der Energiebedarf vermehrt durch Glykolyse und bei länger andauernder Muskelarbeit ergänzend durch β -Oxidation von freien Fettsäuren gedeckt. Zu Beginn der körperlichen Belastung wird zunächst intramuskuläre Glukose verbraucht, die aus dem Abbau der muskulären Glykogenreserven stammt. Ergänzend gelangt Glukose über eine Steigerung des transmembranösen Glukosetransports aus dem Blut in die Muskelzelle. Dies erfolgt durch eine Translokation von Glukosetransportern, im Fall der Muskulatur GLUT-4, von intrazellulären Vesikeln an die Muskelzellmembran, ein Vorgang, der insulinunabhängig ist und durch Muskelkontraktion induziert wird. Die Eigenkontraktion der Muskelfasern ist somit der physiologischen Wirkung des Insulins ähnlich, auch wenn Insulingaben bei absolutem Insulinmangel dadurch natürlich nicht gänzlich ersetzt werden können. So kann auch bei Insulinresistenz wie bei Typ-2-Diabetes eine Steigerung des transmembranösen Glukosetransports ermöglicht und eine Senkung des Glukosespiegels induziert werden [12].

Der durch die Muskelarbeit bedingte systemische Glukoseabfall wird durch eine präzise und adäquate Steigerung der hepatischen Glukosefreisetzung ausgeglichen, wenn keine gleichzeitige Glukoseresorption aus der Nahrung zur Verfügung steht. Die Steigerung dieser Freisetzung wird im Wesentlichen durch eine Hemmung der pankreatischen Insulinsekretion und den daraus resultierenden Abfall des Insulinspiegels im Pfortaderblut bewirkt. Unterstützend und modulierend wirken dabei die kontrainsulinären Hormone (Glukagon, Katecholamine und Cortisol). Fehlen Hormone wie Glukagon nach Zelluntergang wie bei der Pankreatitis, ist diese Gegenregulation aufgehoben, und dies kann zu schwerwiegenden, z. T. letalen Hypoglykämien führen.

Diese hepatischen und muskulären Energiespeicher werden während und nach Beendigung der Muskelarbeit wieder aufgefüllt. In Abhängigkeit vom Entleerungsgrad kann die Glukoseaufnahme in die Muskulatur noch bis zu 48 Stunden nach Ende der Muskelarbeit erhöht sein, was für die medikamentöse Einstellung und Reduktion der Insulindosis von Bedeutung ist.

Nutzen und Herausforderungen von körperlicher Aktivität bei Typ-1-Diabetes

Pathophysiologie

Bei Menschen mit Typ-1-Diabetes mellitus fehlt die pankreatische Insulinsekretion, die exogen substituiert werden muss. Mit jeder subkutanen Insulininjektion kommt es zu einem peripheren Insulinüberschuss, der die muskuläre Glukoseaufnahme steigert, gleichzeitig aber die hepatische Glukosefreisetzung blockiert. Daraus resultiert ein Abfall des Blutglukosespiegels, der bei erhöhtem Ausgangsserumwert erwünscht ist, aber bei längerer Dauer der körperlichen Aktivität und bei bereits zu Beginn der Muskelarbeit bestehender Normoglykämie rasch unerwünschte Hypoglykämien zur Folge hat. Deshalb ist die genaue Abstimmung aus Bewegungssteigerung und Reduktion der Insulindosis von zentraler Bedeutung.


Zu Problemen kann es ebenfalls kommen, wenn körperliche Aktivität ausgeübt wird und bereits länger ein Mangel an Basisinsulin vorherrscht, weil unter Ruhebedingungen ohne Insulin eine Aufnahme von Glukose in die periphere Muskulatur kaum möglich ist. Das Auslassen von Insulininjektionen oder Katheterokklusionen bei Insulinpumpentherapie führen zu absolutem, Infekte zu relativem Insulinmangel. Dieser induziert eine Steigerung der kontrainsulinären Hormone mit Steigerung der hepatischen Glukosefreisetzung. Da gleichzeitig die Glukoseaufnahme in die Muskulatur eingeschränkt ist, steigt der Serumglukosespiegel an. Aufgrund der reduziert verfügbaren intramuskulären Glukose wird bei gesteigertem Energiebedarf der arbeitenden Muskulatur dieser dann primär durch freie Fettsäuren gedeckt, was die Entstehung einer potenziell lebensgefährlichen Ketoazidose bei Insulinmangel während Muskelarbeit erklärt.

Konsequenzen für sportliche Aktivität bei Typ-1-Diabetes

- Sport und Spiel sind für alle Menschen ein Stück Lebensqualität und insbesondere für Kinder und Jugendliche ein wichtiges sozialintegratives Moment, das auch bei Menschen mit Typ-1-Diabetes mellitus gefördert werden sollte.
 - Regelmäßige sportliche Aktivität spielt auch bei Menschen mit Typ-1-Diabetes mellitus eine wichtige Rolle zur Verbesserung des kardio-vaskulären Risikoprofils [13].
 - Allerdings führen körperliche Aktivität und Training zu verstärkten Glukoseschwankungen während und nach körperlicher Belastung.
 - Ein körperliches Training kann dann uneingeschränkt empfohlen werden, wenn Insulininjektion, Glukoseaufnahme über die Nahrung und Energieumsatz durch körperliche Aktivität präzise aufeinander abgestimmt werden. Die Therapieanpassung wird vereinfacht, wenn körperliche Aktivität regelmäßig, möglichst gleichartig und täglich durchgeführt wird. Im Gegensatz hierzu ist die Therapieanpassung an sporadische oder ungewohnte Belastungen gerade bei ungeschulten und unerfahrenen Patienten deutlich erschwert und führt häufiger zu Stoffwechselkapriolen.
- Aufgrund der individuellen Unterschiede im Ansprechen 1. des muskulären Glukosestoffwechsels auf körperliche Belastung, 2. des Glukoseanstiegs nach Nahrungsaufnahme, 3. der Insulinreaktion nach Injektion sowie 4. des körperlichen Trainingszustands der Muskulatur und des gesamten Organismus ist eine praktische Wissensvermittlung und Schulung inklusive der Ermittlung der individuellen Anpassung von zentraler Bedeutung [14].
 - In ► **Abb. 1** werden die verschiedenen Belastungsformen (aerob, gemischt aerob-anaerob und anaerob) dargestellt mit dem jeweils zu erwartenden Einfluss auf den Blutglukosespiegel unter Belastung. Längere Belastungen im aeroben Intensitätsbereich induzieren primär eine Hypoglykämie, wenn keine Anpassung der Insulindosis bzw. Kohlenhydratzufuhr erfolgt. Klassische aerobe Sportarten sind Walken, Wandern, Radfahren, Schwimmen, Langlaufen etc., die mit moderater Intensität über eine gewisse Dauer absolviert werden. Bei isolierten intensiven anaeroben Aktivitäten, wie z. B. Sprints, kommt es dagegen durch die Freisetzung von Katecholaminen gewöhnlich zu einem Anstieg des Blutzuckers. Spielsportarten sind gekennzeichnet durch einen Wechsel von geringer, moderater und hoher Intensität. Dabei wird meist durch die unterschiedlichen Intensitäten eine stabile Blutzuckerlage erzielt. Grundsätzlich muss beachtet werden, dass es trotz eines anaerob induzierten Anstiegs des Blutzuckerspiegels während der Belastung in der Nachbelastungsphase zu einer auch protrahierten (nächtlichen) Hypoglykämie kommen kann und Kohlenhydratzufuhr und Insulindosis dementsprechend angepasst werden müssen. Aktuelle Real-World-Daten zeigen allerdings, dass intensives Intervall- und auch Krafttraining – durchgeführt im Rahmen eines Heimtrainings – auch zu einer signifikanten Abnahme des Blutzuckerspiegels führen können [15]. Die konkrete Blutzuckerantwort jedes Einzelnen ist abhängig von vielen Faktoren und muss bei Neubeginn von sportlicher Aktivität durch regelmäßige Blutzuckermessungen sowohl während als auch bis zu 12 h nach der Aktivität erfasst werden. Individuelle Abweichungen von den in ► **Abb. 1** dargestellten Glukosetrends bei körperlicher Belastung sind möglich. Es können sich entsprechende Bedarfe für eine Therapieanpassung ergeben.

Praxis der Prävention sportinduzierter Komplikationen: Basisregeln

- Da es nur grobe Dosis-Wirkungs-Beziehungen gibt, müssen individuelle Anpassungsregeln für jeden Patienten erarbeitet werden.
- Dazu sollten bei sportlicher Aktivität regelmäßig Glukoseprofile erstellt und zusammen mit Insulindosis, Injektions-Trainingszeit-Abstand, Zusatzkohlenhydraten und Belastungsform (Ausdauer-, Krafttraining, Intensität, Trainingspuls) in einem Sporttagebuch oder digital protokolliert werden. Dieses Protokoll bildet die Basis für die Analyse individueller Stoffwechselreaktionen beim Sport, dient zur Sammlung von Erfahrungen und hilft bei der Therapieoptimierung mit dem Ärzte- oder Diabetesteam.



► **Abb. 1** Verschiedene Belastungsarten (aerob, gemischt aerob-anaerob, anaerob) und der jeweilige erwartete Glukosetrend. Die Reaktionen können jedoch individuell verschieden sein. Daten nach [16].

- Bei Glukosewerten über 270 mg/dl (15 mmol/l) sollte eine Testung auf Ketonkörper erfolgen. Sind Ketonlevel im Blut gering (<0.6 mmol/l) kann leichte bis moderat-intensive Aktivität durchgeführt werden, sind sie leicht erhöht (bis zu 1,4 mmol/l), sollte man sich nur mit leichter Intensität und weniger als 30 Minuten belasten. Zusätzlich ist ggf. eine Insulinkorrektur notwendig bevor mit dem Sport begonnen wird. Bei Werten $\geq 1,5$ mmol/l sind Bewegungsaktivitäten kontraindiziert und Maßnahmen zur Rekompensation erforderlich [17].
- Die Verwendung von Geräten zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) kann hilfreich sein, um Stoffwechselreaktionen beim/nach Sport besser einzuschätzen. Der Glukosewert wird dabei jedoch in der Gewebsflüssigkeit (Interstitium) und nicht im Blut gemessen. Vor Beginn von sportlicher Aktivität sollte das Alarmprofil im CGM-System angepasst werden: niedrige Alarmgrenze anheben und Voralarm sehr empfindlich einstellen, hohe Alarmgrenze anheben oder sogar deaktivieren und Voralarm hier auf geringe Empfindlichkeit einstellen oder deaktivieren.
- Bei körperlicher Aktivität kann es zu größeren Abweichungen zwischen dem Glukosewert gemessen im Interstitium und im Blut kommen. Daher sollten sich Menschen mit Diabetes beim Sport eher an den Trendpfeilen orientieren als an exakten Glukosewerten.
- Der Einsatz von CGM-Systemen kann Menschen mit Diabetes mellitus helfen, die Stoffwechsellage im Zusammenhang mit Sport und Bewegung besser einzuschätzen. Im Positionspapier der European Association for the Study of Diabetes (EASD) werden Empfehlungen abgegeben, welche Entscheidungen zur Aufnahme von Kohlenhydraten oder Insulintherapie vor, beim und nach Sport sinnvoll sein können, in Abhängigkeit vom aktuellen Sensorglukosewert, der Trendrichtung und dem weiteren erwarteten Verlauf des Glukosespiegels sowie der abgeschätzten Sportererfahrung und dem Hypoglykämierisiko [18].
- Bei der Nutzung eines AID-Systems (AID = Automatische Insulin dosierung; d. h. ein Algorithmus reduziert oder steigert die Insulinabgabe der Insulinpumpe in Abhängigkeit von den CGM-Daten) ist die Therapieanpassung an körperliche Aktivität sehr system- und produktspezifisch. Zur Sportanpassung sehen die AID-Systeme in der Regel einen Aktivitätsmodus oder die Möglichkeit einer temporären Erhöhung des Glukose-Zielwertes vor. Diese Eingabe muss rechtzeitig erfolgen (mind. 90–120 Minuten vor Beginn!); für längere und/oder intensivere Aktivitäten ist dies jedoch oft nicht ausreichend. Hier ist es oft empfehlenswert, je nach System schrittweise weitere AID-Parameter für die Dauer der Aktivität zu verstellen, oder sogar den AID-Modus zu pausieren und die Therapieanpassung wie beschrieben manuell durchzuführen, um Hypoglykämien zu verhindern (im AID-Modus kann es auch im „Sport-Modus“ zu überhöhten Insulinabgaben z. B. nach Glukoseanstieg durch Sport-Kohlenhydrateinheit (KE) kommen). Hilfreiche system-spezifische Tipps finden sich hier: <https://www.vdbd-akademie.de/videofortbildungen/vfb-aid-systeme-in-der-gebuehren-freien-version/> (Bitte auf „Bonusmaterial“ klicken!).

- Bei leistungsorientierten Athleten kann eine Ergometrie inklusive Laktattestung oder Spiroergometrie zur Bestimmung des aeroben und anaeroben Stoffwechsels erfolgen. Aufgrund der Bestimmung dieser Stoffwechselgrenzen und der assoziierten Pulsfrequenzen können dezidierte Trainingsempfehlungen gegeben werden.
- Belastungen im aeroben Bereich führen primär zu einer Hypoglykämie, anaerobe Belastungen zu einer Hyperglykämie. Bei dieser letzten, intensiven Belastungsform werden vermehrt Katecholamine freigesetzt, die unter Belastung zu Blutglukoseanstiegen führen können. In der Nachbelastungsphase, gerade jenseits von 6 h, können dann aber Hypoglykämien begünstigt werden (sogenannter Muskelauffülleffekt). Dabei muss vor allem auch auf nächtliche Hypoglykämien geachtet werden.
- Beim Sport immer ein SOS-Sportset (z. B. Traubenzucker, Glukosegels, Softdrinks, Saft) mitführen, um bei Hypoglykämie sofort reagieren zu können.
- Bei langen Belastungen im Wasser, die Blutzuckermessungen unmöglich machen, sollte auf die Verwendung eines CGM-Systems zurückgegriffen werden. Dann muss der Empfänger des CGM-Systems mit einer wasserfesten, aber funkdurchlässigen Schutzhülle mitgeführt werden.
- Sportkameraden, Freunde, Trainer, Lehrer über Hypoglykämierisiko und Gegenmaßnahmen informieren.
- Umgebungsbedingungen (Hitze, Kälte) und Höhe müssen mitberücksichtigt werden, da diese die Interaktion zwischen Insulin, Glukose, Glukagon und Katecholaminen beeinflussen. In diesen Fällen sind häufigere Blutzuckerkontrollen indiziert.
- Bei Verwendung eines CGM-Systems sollte der Trendpfeil bei Werten, die im Bereich zwischen 120–180 mg/dl (6,7–10,0 mmol/l) liegen, vor Aufnahme von körperlichen Aktivitäten mit zu erwartendem Glukoseabfall (z. B. moderates Ausdauertraining) horizontal bis steigend sein. Je niedriger der Ausgangswert, umso wichtiger ist ein tendenziell stabiler, bzw. steigender Trend.
- Zeitpunkt der letzten Mahlzeit vor der Bewegung
- Art und Menge der aufgenommenen Kohlenhydrate
- Vor mehrstündigem und ganztägigem Sport Bolus- und Basalinsulin bis zu 50 % reduzieren, da die Auffüllung der muskulären Glykogendepots bis zum Folgetag dauern kann. Gleichzeitig sollte eine Kohlenhydratzufuhr nach dem Sport erfolgen. Aufgrund ihrer langen Wirkdauer (Insulin Degludec > Insulin Glargin U300 > Insulin Glargin U100 > Insulin Detemir) sind Empfehlungen zur Basalinsulindosisreduktion im Rahmen einer Multiple daily injection (MDI), bzw. ICT-Therapie mit langwirksamen Insulinanaloga, schwierig allgemeingültig zu formulieren und in der Regel nur bei mehrstündigen, ganz- oder mehrtägigen Aktivitäten sinnvoll.
- Bei Sport von kurzer Dauer und geringer Intensität nur zusätzliche Kohlenhydrate (sog. Sport-KE) zuführen
- Bei Sport in der Wirkungszeit des Bolusinsulins dieses um 25–75 % reduzieren.
- Wenn die Verminderung der Insulindosis nicht möglich ist, müssen je nach Aktivität und Intensität 0,5–1,0 g Kohlenhydrate mit hoher Energiedichte/kg Körpergewicht/h in kleinen Mengen (alle 20–30 Minuten) getrunken oder gegessen werden [16].
- Mehrere Portionen von 1–2 KHE sollen auf den Zeitraum vor, während und nach der Bewegung verteilt werden.
- In Abhängigkeit von Dauer und Intensität können Zusatzkohlenhydrate von insgesamt 8 KHE oder mehr erforderlich sein. Geeignet sind Cola, Fruchtsäfte, Müsliriegel, Obst und Brot.
- Bei festen Kohlenhydraten wie Brot müssen diese mindestens 1–2 Stunden vor Belastungsbeginn zugeführt werden. Während körperlicher Aktivität sind flüssige Kohlenhydrate zu empfehlen.
- Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr muss immer geachtet werden. Erhöhte Blutzuckerwerte erfordern eine zusätzliche Steigerung der Flüssigkeitszufuhr, um eine Dehydrierung zu vermeiden.
- Bei einer post HIIT (High-Intensity-Intervall-Training)-Hyperglykämie ist eine Korrektur basierend auf dem üblichen Korrekturfaktor eines Patienten sicher und sicher wirksam [25].

Dosisfindung für Insulin und Zusatzkohlenhydrate

Für die Festlegung der Insulindosisreduktion und zusätzlicher Kohlenhydrate beim Sport müssen folgende Faktoren berücksichtigt werden [14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2]:

- Alter
- Kardio-vaskuläre Risikofaktoren und Erkrankungen
- Diabeteskomplikationen
- Medikation
- Trainingszustand
- Art, Intensität und Dauer der Muskularbeit
- Physischer/Mentaler Stress (z. B. Wettkampf)
- Tageszeitpunkt der Aktivität
- Phasen des Menstruationszyklus
- Einflüsse auf Insulinverfügbarkeit durch Umgebungstemperatur, Injektionsort und -zeitpunkt des Insulins, Art des Insulinpräparats (Normalinsulin, Basalinsulin, Mischinsulin, Insulinanaloga), Höhe der Insulindosis, Art der Therapieform (konventionelle Insulintherapie [CT], intensivierete konventionelle Insulintherapie [ICT], kontinuierliche subkutane Insulininfusion [CSII])
- Höhe des aktuellen Blutzuckers vor der Bewegung: In Abhängigkeit von der Sportart und den genannten Einflussfaktoren sind in der Regel Ausgangswerte zwischen 120 und 180 mg/dl (6,7–10,0 mmol/l) anzustreben. Bei besonderem Hypoglykämierisiko können auch höhere Werte sinnvoll sein. Dann besonders auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.

INFORMATION

Prävention sportinduzierter Komplikationen bei der Therapie mit einer Insulinpumpe

- Für Reduktion des Mahlzeitenbolus und zusätzlicher Kohlenhydrate: gleiche Regeln wie bei traditioneller Insulininjektionstechnik
- Bei Sport von mehr als 1–2 h Halbierung der Basalrate bei Normalinsulin 2 h und bei Analoginsulin ca. 1–2 h vor Sportbeginn, dann je nach Dauer und Intensität

- Bei Ablegen der Pumpe für mehr als 2–4 h Umstellung auf eine ICT (Insulinpenthherapie (multiple dose injection – MDI)),
- Nach der Aktivität wegen des Muskelauffülleseffekts Reduktion der Basalrate um 10–50% für bis zu 14 Stunden

INFORMATION

Prävention sportinduzierter Komplikationen bei der Therapie mit Insulinanaloga

- Bei Sportbeginn bis zu 3 h nach Insulininjektion und einer Mahlzeit Reduktion kurz wirkender Insulinanaloga um 25–75 %
- Bei Sportbeginn mehr als 3 h nach Insulininjektion und einer Mahlzeit keine Reduktion kurz wirkender Insulinanaloga, bedarfsweise zusätzliche Kohlenhydrate
- Bei kurzzeitigem Sport keine Reduktion lang wirkender Insulinanaloga; ggf. zusätzliche Kohlenhydrate bzw. Reduktion kurzwirksamer Insuline zur Vermeidung von Hypoglykämien
- Vor ganztägigen körperlichen Aktivitäten Reduktion von langwirksamen Insulinanaloga

Besonderer Hinweis zum Wettkampf- und Extremsport bei Typ-1-Diabetes

Menschen mit Typ-1-Diabetes mellitus können im Grunde jegliche Sportart auch als Wettkampf- oder Leistungssport ausüben. Allerdings sind Sportarten, bei denen das Risiko von Bewusstseinsstörungen/eingeschränkter Urteilsfähigkeit infolge evtl. Hypoglykämien erhöht ist (z. B. Tauchen, Fallschirmspringen, Extremklettern, Skitouren in großer Höhe, Wildwasserkanufahren oder Drachenfliegen) weniger geeignet. Falls diese Sportarten doch durchgeführt werden, erfordern sie eine langjährige persönliche Erfahrung des Patienten, besonders sorgfältiges Verhalten, individuelle Planung und eine intensive Schulung.

Nutzen und Herausforderungen von Muskularbeit bei gestörter Glukosetoleranz/ Typ-2-Diabetes

Pathophysiologie

Die grundlegende pathophysiologische Störung bei Patienten mit gestörter Glukosetoleranz und Typ-2-Diabetes mellitus ist eine gestörte Insulinsensitivität, häufig in Verbindung mit einer relativen Reduktion der pankreatischen Insulinsekretion. Ursachen dafür sind Bewegungsarmut und hyperkalorische Ernährung. Maßnahmen, die eine Steigerung der Insulinsensitivität induzieren, wie regelmäßige muskuläre Belastung, bieten eine kausale therapeutische Option. Jede Bewegung der Muskelfasern steigert den transmembranösen Glukosetransport durch Stimulation der Translokation von Glukosetransportern wie GLUT-4 aus intrazellu-

lären Vesikeln an die Muskelzellmembran. Diese führt zur Blutzuckersenkung unter körperlicher Belastung, ein Vorgang, der unabhängig vom regulären Glukoseaufnahmeweg über den Insulinrezeptor vermittelt wird [12]. Dieser akute Prozess, der bereits nach 20–30 min zu beobachten ist, kann durch ständige Wiederholung von Muskularbeit wie durch Ausdauer- oder Krafttraining verstetigt werden. Ergänzend sind weitere Mechanismen wie eine stärkere Insulinbindung an muskuläre Insulinrezeptoren wie auch eine Zunahme der Zahl der muskulären Insulinrezeptoren ebenso wie eine gesteigerte Aktivität von Enzymen des Energiestoffwechsels und die Zunahme der muskulären Kapillardichte beteiligt [12].

Therapeutischer Nutzen

- Lebensstilmaßnahmen mit Ernährungsumstellung und Erhöhung der körperlichen Aktivität zur Gewichtsreduktion sind essenziell für übergewichtige Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und können zu einer Remission der Erkrankung führen. Übergewichtige Diabetespatienten, die in einem normalen hausärztlichen Setting betreut werden, können durch eine Kalorienreduktion (hypokalorischer Mahlzeitenersatz über 3 Monate mit ca. 800 kcal/Tag) mit anschließendem Wiederaufbau von normaler Kost und Empfehlung zu einer Aktivität von optimalerweise 15000 Schritten pro Tag deutlich an Gewicht abnehmen und eine Remission des Diabetes erzielen [26]. In einer randomisierten Interventionsstudie hatte fast die Hälfte der Patienten (46%) nach einjähriger Intervention keinen Diabetes mellitus mehr und fast ein Viertel der Patienten (24%) hatte eine Gewichtsabnahme von ≥ 15 kg erzielt. Auch in der Langzeitauswertung nach 2 Jahren [27] konnten diese positiven Daten bestätigt werden: Fast ein Drittel der Patienten war immer noch in Remission. Fazit für die Praxis: Lebensstilmaßnahmen zur Gewichtsreduktion sind für übergewichtige Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 als essenzielle Therapie zu sehen.
- Bei bestehendem Typ-2-Diabetes bewirkt die Kombination aus regelmäßigem Ausdauer- und Krafttraining offenbar die größten Effekte auf HbA_{1c} -Werte im Vergleich mit den Wirkungen der Trainingsformen allein. Reduktionen von 0,8–0,9% zusätzlich zur medikamentösen Therapie sind im Durchschnitt zu erwarten [28, 29].
- Das kardio-vaskuläre Risikofaktorenprofil bei Insulinresistenz und Metabolischem Syndrom kann durch Lebensstilumstellung signifikant verbessert werden [30].
- Unklar sind die Effekte einer Lebensstilintervention auf die kardio-vaskuläre Ereignisrate [31, 32]. Ein vermindertes Risiko für die Entstehung von Sekundärerkrankungen/mikrovaskulärer Komplikationen ließ sich in zahlreichen Studien nachweisen [32].
- Die positiven Effekte körperlichen Trainings auf den muskulären Glukosetransport halten nach Beendigung des Trainings nur wenige Tage an. Um einen dauerhaften positiven Therapieeffekt zu erreichen, ist eine muskuläre Belastung von mindestens 3×/Woche notwendig. Eine lebenslange Umstellung auf einen aktiven Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung ist erforderlich.

Hindernisse auf dem Weg zu einem aktiven Lebensstil und Überlegungen zu deren Überwindung

Ein grundlegendes Problem besteht darin, dass die Mehrzahl aller Menschen mit Typ-2-Diabetes mellitus älter als 60 Jahre ist und wegen erhöhter Morbidität und Risikofaktoren (koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, periphere arterielle Verschlusskrankheit, periphere diabetische Neuropathie, proliferative diabetische Retinopathie, arterielle Hypertonie), orthopädischen Erkrankungen, Immobilität und fehlender Motivation nicht oder nur eingeschränkt an Bewegungsprogrammen teilnehmen kann. Allerdings ist gerade in diesen Fällen der Nutzen körperlicher Aktivität besonders evident.

- Bewegungsprogramme sollten vor allem dazu genutzt werden, Freude an der Bewegung zu wecken und den Einstieg in einen aktiven Lebensstil zu ermöglichen.
- Um bei älteren Menschen Erfolg zu haben, müssen Bewegungsprogramme deren körperliche Fähigkeiten, altersbedingten Leistungsabbau, krankheitsbedingte Beeinträchtigungen, ihre Interessen, ihre sozialen Bindungen und vor allem ihre Lebensgewohnheiten berücksichtigen.
- Konkrete Empfehlungen im Sinne eines Trainingsplans sind essenziell. Die Zielsetzung kann nach dem SMART-Prinzip erfolgen. S = Spezifisch, M = Messbar, A = Aktivierend, R = Realistisch, T = Terminiert. Ein Trainingsplan sollte sowohl die Art als auch die Dauer und Intensität der Belastung vorgeben. Wichtig ist zu Beginn, dass Empfehlung zum Sport und ggf. erste Übungsanleitungen möglichst durch den behandelnden Arzt oder Diabetesberater stattfinden. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit der Bewegungstherapie als eines wesentlichen Teils der Gesamttherapie.
- Bewegungsprogramme sind dann zum Scheitern verurteilt, wenn sie die potenziellen Teilnehmer körperlich und psychisch überfordern. Dies ist gerade zu Beginn des Trainings innerhalb der ersten 6 Wochen von zentraler Bedeutung, denn zumeist ist das Belastungsniveau extrem niedrig. Zur Bewegungssteigerung sind „kleine“ Ziele sinnvoll. Eine Metastudie mit gesunden Personen und solchen mit erhöhtem Risiko für kardio-vaskuläre Erkrankungen zeigte, dass bereits 500 Schritte mehr pro Tag das kardio-vaskuläre Mortalitätsrisiko um ca. 7 % senken können [33].
- Entscheidend zu Beginn des Trainings ist die Regelmäßigkeit, auch wenn es nur 5 min am Tag sind. Steigerung der Dauer und Intensität ist in den ersten Wochen nachrangig und kann individuell angepasst werden. Als grobe Faustregel kann eine Steigerung der Dauer um 1 min pro Trainingseinheit pro Woche angenommen werden (Prinzip: „Start low – go slow“). Bewegungsprogramme, die diese Prinzipien nicht berücksichtigen, können eher schaden, wenn sie organische Schäden auslösen und Minderwertigkeits- oder Schuldgefühle wecken oder verstärken.
- Bewegungsprogramme können Keimzelle für neue Freundeskreise werden, in denen Wandern, Nordic-Walking, Radfahren, Schwimmen, Gymnastik oder andere Ausdauersportarten gepflegt werden. Diese Gemeinschaft verstärkt die Adhärenz zu den Programmen.

- Bewegungsprogramme für Menschen mit Diabetes mellitus werden auch im Rahmen von ambulanten Diabetesgruppen angeboten, können aber auch in ambulante Herzsportgruppen integriert werden. Letztere sind besonders für Menschen mit Diabetes mellitus mit Herzerkrankungen sinnvoll.

Chancen und Möglichkeiten der digitalen Welt im Kontext Bewegung

Die Nutzung der kontinuierlichen Glukosemessung mit und ohne Insulinpumpentherapie hat viele Patienten in die Lage versetzt, die metabolische Kontrolle bei Bewegung und Sport besser zu überwachen, zu kontrollieren und zu optimieren. Die individuelle Blutzuckerreaktion auf verschiedene körperliche Belastungen ist leichter erlernbar, und Hypoglykämien sind früher vorhersagbar und behandelbar [34, 35, 36, 37]. Es gibt zudem bereits einige Pilotstudien, die darauf hindeuten, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes mellitus durch CGM motiviert werden können, ihr Ernährungs- und Bewegungsverhalten positiv zu verändern und ihre glykämische Kontrolle zu verbessern [38, 39, 40].

Sensoren, die nichtinvasiv physiologische Signale wie z. B. Herzfrequenz, Beschleunigung, Wärmefluss und Hautfeuchtigkeit aufzeichnen, können zur Trainingsüberwachung eingesetzt werden [41]. Wearables (u. a. Sportuhren, Fitness- und Aktivitätstracker, Smartwatches) bieten auch bei geringen Bewegungsumfängen die Chance, zur individuellen körperlichen Aktivität zu motivieren und diese zu überwachen.

Diverse Gesundheits-Apps zur Optimierung des Lebensstils können für die Prävention und Therapie genutzt werden [42, 43, 44, 45]. Es gibt Gesundheits-Apps zum Selbstmanagement bei Gestationsdiabetes [43, 46] oder Smartphone-Apps für Sportler mit Typ-1-Diabetes [47]. Ihre Qualität und ihr Nutzen sollten wissenschaftlich belegt sein und erst dann sollten sie allgemein empfohlen werden.

Telemedizinisches Coaching [48], digitale Selbsthilfe [49] und Fitness-Portale für ein Training per Stream oder Download können Bewegung ohne örtliche Bindung fördern.


Digitale Gesundheitsangebote (DIGA), Gesundheitsapps auf Rezept, zielen zum Teil auch auf Lebensstilveränderungen mit mehr Sport und Bewegung ab [3]. Die Hersteller müssen einen Wirksamkeitsnachweis erbringen. Im Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gibt es ein DIGA-Verzeichnis. Hier können sich Ärzte und Patienten über aktuelle Angebote informieren: <https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis?search=diabetes>.

Gerade in einer bewegungsarmen digitalen Welt besteht die Chance, besonders bei bewegungsarmen Kindern durch digitale Bewegungsspiele (Exergaming) eine Verbesserung der körperlichen und kognitiven Leistungsfähigkeit zu erreichen [50].

Mit E-Bikes bekommen Menschen mit eingeschränkter körperlicher Leistungsfähigkeit neue Freiheitsgrade, sodass die Fitness bei deren Nutzung zunehmen kann [51].

Lange Sitzzeiten überwinden

Eine Stunde zusätzliches Sitzen am Tag erhöht die Wahrscheinlichkeit um 22 % für die Entstehung eines Typ-2-Diabetes mellitus [52]. Dies macht es unbedingt auch erforderlich, Sitzzeiten bei



► **Abb. 2** Konzept zur schrittweisen Steigerung der körperlichen Aktivität. Daten nach [53].

der Gesundheitsprävention am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Für Personen mit einem großen Anteil an sitzender Tätigkeit ist es besonders schädlich, wenn sie in ihrer Freizeit auch noch inaktiv sind [53]. Die aktive Unterbrechung der sitzenden Tätigkeit ist besonders für diese Personengruppe wichtig (► **Abb. 2**).

Eine niederländische Studie zeigte, dass häufiges Unterbrechen des Sitzens durch Stehen und leichtes Gehen den 24-Stunden-Glukosespiegel und die Insulinsensitivität bei Personen mit Typ-2-Diabetes mellitus sogar in höherem Maße verbessern kann als strukturierte Bewegung. Es wird gefolgert, dass eine häufige Unterbrechung des Sitzens durch Stehen und leichtes Gehen eine Alternative zu strukturierter Bewegung sein kann, um die Blutzuckerkontrolle bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus zu fördern [54]. Eine Pilotstudie zeigte, dass die Nutzung eines Schreibtischfahrrads zu niedrigeren Insulinkonzentrationen nach den Mahlzeiten führen kann. Dies könnte ein besonderer Lösungsansatz bei dominant sitzenden Tätigkeiten sein, die Gesundheit zu erhalten [55].

Praktisches Vorgehen bei der Durchführung von Bewegungsprogrammen

- **Ausdauerorientierte Bewegungsprogramme** sollen primär die aerobe Kapazität steigern und sind aufgrund der positiven metabolischen und kardiopulmonalen Effekte eine gute Trainingsart. Empfehlenswert sind Ausdauersportarten, die dynamische Beanspruchungen möglichst großer Muskelgruppen gegen einen möglichst geringen Widerstand in rhythmisch gleichbleibender Form erlauben, wie z. B. Nordic-Walking, schnelles Gehen/Walken, Bergwandern, Skiwandern, Schwimmen oder Radfahren. Von der Trainingsintensität wird primär ein moderates Ausdauertraining (ca. 50–60% der maximalen Herzfrequenz, aerober Trainingsbereich) empfohlen. Gerade ein Wechsel unterschiedlicher Belastungsintensitäten zwischen ca. 60–80% der maximalen Herzfrequenz (Wechsel aus aerober und anaerober Intensität) im Sinne eines Intervalltrainings kann größere Effekte induzieren [28, 56].
- Auch ein **Krafttraining** für die großen Muskelgruppen sollte zusätzlich empfohlen werden, da die Kraftbelastungen zu einer Zunahme der Muskel- und somit fettfreien Masse führen,

resultierend in einer verbesserten Insulinresistenz. Während der Trainingseinheiten ist allerdings das Risiko durch Blutdruckanstiege bei Vorliegen einer arteriellen Hypertonie zu beachten. Die Blutdruckwerte müssen vor Trainingsbeginn optimal medikamentös sowohl in Ruhe als auch unter Belastung eingestellt sein (Kontrolle beim Belastungs-EKG). Auf eine gleichmäßige Atmung sollte beim Krafttraining geachtet werden, da Pressatmung hohe Blutdruckspitzen hervorrufen kann. Für ein Krafttraining empfiehlt sich ein Ganzkörper-Kraftausdauertrainingsprogramm mit 2–3 Sätzen pro Muskelgruppe bei 15–20 Wiederholungen und einer Intensität von ca. 50–65% vom 1er-Bewegungsmaximum und für Fortgeschrittene ein Muskelaufbautraining bei 8–12 Wiederholungen und einer Intensität von ca. 70–80% vom 1er-Bewegungsmaximum [57].

- Die Bewegungsprogramme sollten auch motorische Beanspruchungsformen enthalten, die **Koordination und Beweglichkeit** verbessern helfen, z. B. im Rahmen von Ballspielen, beim Tanzen oder gezielten Dehnübungen. Erste Studien deuten darauf hin, dass durch (ergänzende) **alternative Trainingsformen** wie Elektromyostimulationstraining (EMS-Training), Ganzkörper-Vibrationstraining oder Sport mit interaktiven Computerkonsolen (Exergaming) bei fachgerechter Anleitung ebenfalls positive Wirkungen, u. a. auf glykämische Werte, bei Patienten mit Typ-2-Diabetes erreicht werden können [58, 59, 60], wengleich die Effektivität im Vergleich zu klassischem Ausdauer-/Krafttraining zukünftig noch weiter zu bewerten ist. Aktuell gilt für ein EMS-Training im kommerziellen Setting Diabetes mellitus als relative Kontraindikation, insbesondere auch, da die Steuerung der Intensität über das eigene Empfinden aufgrund von Neuropathien erschwert bis unmöglich sein kann [4].
- Zusätzlich sollte die **Alltagsaktivität** (Treppensteigen, Spaziergehen, Gartenarbeit etc.) gesteigert werden. Auch dadurch lassen sich bereits positive Effekte auf den Glukosestoffwechsel/die Insulinresistenz erzielen.
- Eine weitere Möglichkeit insbesondere für Menschen, denen regelmäßiger Sport schwerfällt, könnte die Anwendung sogenannter „**Exercise snacks**“ darstellen [5, 6]. Hierbei handelt es sich um kurze Bewegungseinheiten von zum Teil nur 1 Minute Dauer, die mehrfach über den Tag durchgeführt werden, um

die gesundheitsschädlichen Wirkungen langer Inaktivitätsphasen abzuwenden. Sie sollen ohne viel Aufwand in den Lebensalltag integrierbar sein. Insgesamt ist die Evidenzlage aber noch schwach.

- Eine Metastudie hat hervorgebracht, dass bezüglich des **Timings** von Bewegungseinheiten zur Reduktion postprandialer Glukosespitzen Bewegung (wie z. B. 20 Minuten Walking) idealerweise am besten so zeitnah wie möglich nach der Nahrungsaufnahme erfolgen sollte. Dies war günstiger als Bewegung vor dem Essen [7].

INFORMATION

Prinzipien des Bewegungsprogramms bei Typ-2-Diabetes

- Zur Beurteilung der körperlichen Belastung wird als indirektes Maß die Herzfrequenz genutzt, da gesicherte Beziehungen zwischen Herzfrequenz und körperlicher Leistungsfähigkeit ($VO_2\max$) bestehen.
- Der Trainingspuls sollte individuell bestimmt werden, optimal durch Ergometrie mit Laktatbestimmung bzw. spiroergometrisch, ansonsten Ermittlung mithilfe der Karvonen-Formel ($\text{Trainingspuls} = \text{Herzfrequenz (HF)}_{\text{Ruhe}} + (\text{HF}_{\text{max}} - \text{HF}_{\text{Ruhe}}) \times 0,6$). Faustregeln, wie z. B. $\text{HF} = 180/\text{min} - \text{Lebensalter}$ sind ungeeignet.
- Die initiale Belastungsintensität sowie -dauer (anfangs < 10 min pro Trainingseinheit) sollte niedrig gehalten werden. Stattdessen sollte die Bewegung an möglichst vielen Tagen der Woche (optimal täglich) durchgeführt werden bzw. bevorzugt kurze Einheiten mehrmals am Tag. Die Belastungsdauer und -intensität sollte über Wochen langsam gesteigert werden
- Zur Erzielung der gewünschten Langzeiteffekte sind Belastungsintervalle von 20–30 min optimal 6–7 ×/Woche.
- Ergänzend kann die Steigerung der Alltagsaktivität die positiven Effekte verstärken.

Vermeiden von Komplikationen infolge von Bewegungsprogrammen

- Ältere Menschen mit Typ-2-Diabetes mellitus haben im Vergleich zu gleichaltrigen Gesunden ein höheres kardio-vasculäres Risiko. Dieses Risiko liegt umso höher, je geringer die kardio-pulmonale Leistungsfähigkeit ist. Zur Vermeidung unerwünschter kardio-vasculärer Zwischenfälle nach jahrelangem Bewegungsmangel muss vor Beginn eine kardiologische Untersuchung inklusive maximaler Ergometrie (als Abbruchkriterium sollten keine altersäquivalenten Richtwerte, sondern klare Abbruchkriterien gewählt werden, sodass eine individuell maximale Belastungsintensität ermittelt werden kann) durchgeführt werden. Eine gleichzeitige Laktatbestimmung oder Spirometrie kann helfen, die optimale Trainingsintensität festzulegen und ein Training besser individuell zu strukturieren.
- Patienten mit Typ-2-Diabetes haben gehäuft weitere kardio-vasculäre Komplikationen wie koronare Herzerkrankung, Herzinsuffizienz oder peripher-arterielle Verschlusskrankheit.

Die Trainingsintensität sollte darauf abgestimmt werden und ist durch die entsprechende Grunderkrankung limitiert.

- Einschränkungen der Belastbarkeit sind bei Patienten mit Typ-2-Diabetes gehäuft durch eine diastolische Herzinsuffizienz (Heart Failure with preserved Ejection Fraction, HFpEF) bedingt. Dies muss vor Planung des Trainingsprogramms abgeklärt und das Training entsprechend angepasst werden.
- Menschen mit Diabetes mellitus sollten generell niederschwellig auch in Bewegungsprogrammen trainieren. „Laufen ohne Schnaufen“ ist die wichtigste Regel auch für den herzkranken Patienten. Unter diesem Gesichtspunkt ist für den geschulten Patienten eine Arztpräsenz nicht erforderlich. Ein Patient frisch nach dem Herzinfarkt sollte wie üblich mit Arztpräsenz in einer Koronarsportgruppe trainieren.
- Zur Vermeidung von Hypoglykämien sollte eine Blutzuckermessung unbedingt vor, während und nach dem Bewegungsprogramm bei Menschen mit Diabetes mellitus unter Insulintherapie durchgeführt werden. Anpassungen der Insulindosis und Zusatz-KHE sollen berücksichtigt werden.
- Bei proliferativer Retinopathie Blutdruckanstiege über 180–200/100 mmHg vermeiden. Nach Laserung der Netzhaut oder Augenoperation 6 Wochen keine körperliche Belastung. Krafttraining und Kampfsportarten sind bei Retinopathie ungeeignet und potenziell schädlich.
- Bei peripherer diabetischer Neuropathie bestehen Risiken für die Manifestation eines diabetischen Fußulkus durch unpassendes Schuhwerk.
- Bei diabetischem Fußsyndrom muss das angepasste Bewegungsprogramm eine Gewebeüberlastung verhindern und sollte nur von spezialisierten Trainern durchgeführt werden. Bei einem diabetischen Fußulkus muss das Bewegungsprogramm pausiert werden.
- Bei autonomer Neuropathie muss die Störung der physiologischen Blutdruck- und Herzfrequenzregulation beachtet werden.

Verfügbare Konzepte zur Bewegungsinitiierung

Die Arbeitsgruppe „Diabetes, Sport und Bewegung“ der Deutschen Diabetes Gesellschaft stellt mehrere Konzepte für Praxisteam zur Verfügung, welche dazu dienen sollen, Patienten zum Sport/zu mehr Bewegung zu motivieren. Das „Disko+“-Schulungsmodul beinhaltet einen 30-minütigen Spaziergang und die Verwendung von Schrittzählern. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an Daten, die darauf hinweisen, dass die Verwendung eines Schrittzählers die Steigerung der körperlichen Aktivität im Zusammenhang mit Bewegungsprogrammen fördern kann [61]. Im Wechselspiel zwischen konkreten Bewegungszielen (Schrittzahl) und Ergebnismeldung (Schrittzähler) können bemerkenswerte Motivationseffekte entstehen. Das Modul ist in einigen Bundesländern abrechnungsfähig. Das Konzept „Praxis in Bewegung“ dient zur nachhaltigen Bewegungsförderung durch das gesamte Praxisteam. Durch gemeinsames Bewegungserleben soll das gesamte Praxisteam unter Anleitung eines Sporttherapeuten die regionalen Möglichkeiten für Bewegung und Sport kennenlernen, für sich selbst ausprobieren und in einen gemeinsamen Praxisauftritt mit abgestimmten Praxisempfehlungen umsetzen.

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite:
<https://www.diabetes-bewegung.de/>.

Interessenkonflikt

M. Halle erhielt Honorare der Firmen Almased, Abbott, Roche, Amgen, Astra-Zeneca, Berlin-Chemie, BMS, Daiichii-Sankyo, MSD, Novartis, Pfizer, Recordati-Pharma.
 Funding for Institution (studies): Almased für ACCORH-Studie, Weissbräu für MAGIC-Studie; Novartis für Activity Study. Scientific Advisory Board: Novartis.
 C. Brinkmann erhielt Forschungsunterstützung/Honorare der Firmen Astra-Zeneca, Medicap, Abbott, Novo Nordisk sowie Muco Pharma und RG Ärztefortbildung.
 U. Thurm erhielt Berater-/Vortragshonorare der Firmen Diashop, Abbott, Dexcom, Novo Nordisk, Berlin Chemie, Roche, Astra Zeneca.
 S. Kress: Vorträge, Beratertätigkeit für folgende Firmen sowie Einladungen zu Kongressen der letzten 3 Jahre: AstraZeneca, Bayer Vital, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Merck Sharp & Dohme, Novo Nordisk, Sanofi. Mitglied der DDG.
 B. Gehr erhielt Vortrags- und Beratungshonorare von Abbott, Ascensia, Dexcom, Diabeloop, Insulet, Lilly, Novartis, Novo Nordisk, Medtronic, Roche, Vitalaire.

Literatur

- [1] American Diabetes Association. Standards in medical care in diabetes 2024. *Diabetes Care* 2023; 47: S77–S110
- [2] Toor S, Yardley JE, Momeni Z. Type 1 Diabetes and the Menstrual Cycle: Where/How Does Exercise Fit in? *Int J Environ Res Public Health* 2023; 20: 2772
- [3] Bretschneider MP, Schwarz PEH. Digitale Gesundheitsanwendungen – digitale Diabetestherapie mit CGM. *Diabetes aktuell* 2024; 22: 96–97
- [4] Von Stengel S, Fröhlich M, Ludwig O et al. Recommended contraindications for the use of non-medical WB-electromyostimulation. *Front Sports Act Living* 2024; 16: 6
- [5] Wang T, Laher I, Li S. Exercise snacks and physical fitness in sedentary populations. *Sports Med Health Sci* 2024. doi:10.1016/j.smhs.2024.02.006
- [6] Krouwel M, Greenfield SM, Chalkley A et al. Promoting participation in physical activity through Snackivity: A qualitative mixed methods study. *PLoS One* 2023; 18: e0291040
- [7] Engeroff T, Groneberg DA, Wilke J. After Dinner Rest a While, After Supper Walk a Mile? A Systematic Review with Meta-analysis on the Acute Post-prandial Glycemic Response to Exercise Before and After Meal Ingestion in Healthy Subjects and Patients with Impaired Glucose Tolerance. *Sports Med* 2023; 53: 849–869
- [8] Pedersen BK, Saltin B. Exercise as medicine – evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. *Scand J Med Sci Sports* 2015; 25 (Suppl 3): 1–72. doi:10.1111/sms.12581
- [9] Kirchner H, Osler ME, Krook A et al. Epigenetic flexibility in metabolic regulation: disease cause and prevention? *Trends Cell Biol* 2013; 23: 203–209. doi:10.1016/j.tcb.2012.11.008
- [10] Benatti FB, Pedersen BK. Exercise as an anti-inflammatory therapy for rheumatic diseases-myokine regulation. *Nat Rev Rheumatol* 2015; 11: 86–97. doi:10.1038/nrrheum.2014.193
- [11] Fiuzza-Luces C, Garatachea N, Berger NA et al. Exercise is the real polypill. *Physiology* 2013; 28: 330–358. doi:10.1152/physiol.00019.2013
- [12] Stanford KI, Goodyear LJ. Exercise and type 2 diabetes: molecular mechanisms regulating glucose uptake in skeletal muscle. *Adv Physiol Educ* 2014; 38: 308–314. doi:10.1152/advan.00080.2014
- [13] Herbst A, Kordonouri O, Schwab KO et al. Impact of physical activity on cardiovascular risk factors in children with type 1 diabetes: a multicenter study of 23251 patients. *Diabetes Care* 2007; 30: 2098–2100
- [14] Tonoli C, Heyman E, Roelands B et al. Effects of different types of acute and chronic (training) exercise on glycaemic control in type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis. *Sports Med* 2012; 42: 1059–1080. doi:10.1007/BF03262312
- [15] Riddell MC, Li Z, Gal RL et al. Examining the acute glycemic effects of different types of structured exercise sessions in type 1 diabetes in a real-world setting: The type 1 diabetes and exercise initiative (T1DEXI). *Diabetes Care* 2023; 46: 704–713. doi:10.2337/dc22-1721
- [16] Riddell MC, Peters AL. Exercise in adults with type 1 diabetes mellitus. *Nat Rev Endocrinol* 2023; 19: 98–111. doi:10.1038/s41574-022-00756-6
- [17] Riddell MC, Gallen IW, Smart CE et al. Exercise management in type 1 diabetes: a consensus statement. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2017; 5: 377–390. doi:10.1016/S2213-8587(17)30014-1
- [18] Moser O, Riddell MC, Eckstein ML et al. Glucose management for exercise using continuous glucose monitoring (CGM) and intermittently scanned CGM (isCGM) systems in type 1 diabetes: position statement of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) and of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) endorsed by JDRF and supported by the American Diabetes Association (ADA). *Diabetologia* 2020; 63: 2501–2520. doi:10.1111/pedi.13105
- [19] Roberts AJ, Taplin CE. Exercise in Youth with Type 1 Diabetes. *Curr Pediatr Rev* 2015; 11: 120–125. doi:10.2174/1573396311666150702105340
- [20] Pivovarov JA, Taplin CE, Riddell MC. Current perspectives on physical activity and exercise for youth with diabetes. *Pediatr Diabetes* 2015; 16: 242–255. doi:10.1111/pedi.12272
- [21] Bally L, Laimer M, Stettler C. Exercise-associated glucose metabolism in individuals with type 1 diabetes mellitus. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2015; 18: 428–433. doi:10.1097/MCO.000000000000185
- [22] Garcia-Garcia F, Kumareswaran K, Hovorka R et al. Quantifying the acute changes in glucose with exercise in type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Sports Med* 2015; 45: 587–599
- [23] Riddell MC, Scott SN, Fournier PA et al. The competitive athlete with type 1 diabetes. *Diabetologia* 2020; 63: 1475–1490
- [24] Toghi-Eshghi SR, Yardley JE. Morning (fasting) vs afternoon resistance exercise in individuals with type 1 diabetes: a randomized crossover study. *J Clin Endocrinol Metab* 2019; 104: 5217–5224. doi:10.1210/jc.2018-02384
- [25] Aronson R, Brown RE, Li A et al. Optimal insulin correction factor in post high-intensity exercise hyperglycemia in adults with type 1 diabetes: the FIT study. *Diabetes Care* 2019; 42: 10–16
- [26] Lean ME, Leslie WS, Barnes AC. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster randomised trial. *Lancet* 2018; 391: 541–551. doi:10.1016/S0140-6736(17)33102-1
- [27] Lean MEJ, Leslie WS, Barnes AC. Durability of a primary care-led weight management intervention for remission of type 2 diabetes: 2 year results of the DiRECT open-label, cluster randomised trial. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2019; 7: 344–355. doi:10.1016/S2213-8587(19)30068-3
- [28] Röhling M, Herder C, Roden M et al. Effects of Long-Term Exercise Interventions on Glycaemic Control in Type 1 and Type 2 Diabetes: a Systematic Review. *Exp Clin Endocrinol Diabetes* 2016; 124: 487–494. doi:10.1055/s-0042-106293
- [29] Umpierre D, Ribeiro PA, Kramer CK et al. Physical activity advice only or structured exercise training and association with HbA_{1c} levels in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *JAMA* 2011; 305: 1790–1799. doi:10.1001/jama.2011.576
- [30] Wing RR, Bolin P, Brancati FL et al. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. *N Engl J Med* 2013; 369: 145–154. doi:10.1056/NEJMoa1212914

- [31] Goldberg RB, Orchard TJ, Crandall JP et al. Effects of long-term metformin and lifestyle interventions on cardiovascular events in the diabetes prevention program and its outcome study. *Circulation* 2022; 145: 1632–1641
- [32] Rietz M, Lehr A, Mino E et al. Physical activity and risk of major diabetes-related complications in individuals with diabetes: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Diabetes Care* 2022; 45: 3101–3111
- [33] Banach M, Lewek J, Surma S et al. The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis. *Eur J Prev Cardiol* 2023; 30: 1975–1985
- [34] Colberg SR, Laan R, Dassau E et al. Physical activity and type 1 diabetes: time for a rewire? *J Diabetes Sci Technol* 2015; 9: 609–618. doi:10.1177/1932296814566231
- [35] Jayawardene DC, McAuley SA, Horsburgh JC et al. Closed-loop insulin delivery for adults with type 1 diabetes undertaking high-intensity interval exercise versus moderate-intensity exercise: a randomized, crossover study. *Diabetes Technol Ther* 2017; 19: 340–348
- [36] Breton MD, Chernavsky DR, Forlenza GP et al. Closed-loop control during intense prolonged outdoor exercise in adolescents with type 1 diabetes: the artificial pancreas ski study. *Diabetes Care* 2017; 40: 1644–1650
- [37] Dovc K, Macedoni M, Bratina N et al. Closed-loop glucose control in young people with type 1 diabetes during and after unannounced physical activity: a randomised controlled crossover trial. *Diabetologia* 2017; 60: 2157–2167
- [38] Porter M, Fonda S, Swigert T et al. Real-time continuous glucose monitoring to support self-care: results from a pilot study of patients with type 2 diabetes. *J Diabetes Sci Technol* 2022; 16: 578–580
- [39] Taylor PJ, Thompson CH, Luscombe-Marsh ND et al. Tolerability and acceptability of real-time continuous glucose monitoring and its impact on diabetes management behaviours in individuals with type 2 diabetes – A pilot study. *Diabetes Res Clin Pract* 2019; 155: 107814
- [40] Vallis M, Ryan H, Berard L et al. How continuous glucose monitoring can motivate self-management: Can motivation follow behaviour? *Can J Diabetes* 2023; S1499–S2671: 00064–3. doi:10.1016/j.cjcd.2023.04.001
- [41] Ding S, Schumacher M. Sensor monitoring of physical activity to improve glucose management in diabetic patients: a review. *Sensors* 2016; 16: 589. doi:10.3390/s16040589
- [42] Lunde P, Blakstad Nilsson B, Bergland A et al. The effectiveness of smartphone apps for lifestyle improvement in noncommunicable diseases: systematic review and meta-analyses. *J Med Internet Res* 2018; 20: 1–12
- [43] Wu X, Guo X, Zhang Z. The efficacy of mobile phone apps for lifestyle modification in diabetes: systematic review and meta-analysis. *JMIR mHealth uHealth* 2019; 7: e12297. doi:10.2196/12297
- [44] Yom-Tov E, Feraru G, Kozdoba M et al. Encouraging physical activity in patients with diabetes: intervention using a reinforcement learning system. *J Med Internet Res* 2017; 19: e338
- [45] Jimenez G, Lum E, Car J. Examining diabetes management apps recommended from a Google search: content analysis. *JMIR mHealth uHealth* 2019; 7: e11848. doi:10.2196/11848
- [46] Pais S, Parry D, Petrova K et al. Acceptance of using an ecosystem of mobile apps for use in diabetes clinic for self-management of gestational diabetes mellitus. *Stud Health Technol Inform* 2017; 245: 188–192
- [47] Kordonouri O, Riddell MC. Use of apps for physical activity in type 1 diabetes: current status and requirements for future development. *Ther Adv Endocrinol Metab* 2019; 10: 1–7. doi:10.1177/2042018819839298
- [48] Thomas JG, Bond DS, Raynor HA et al. Comparison of smartphone-based behavioral obesity treatment with gold standard group treatment and control: a randomized trial. *Obesity (Silver Spring)* 2019; 27: 572–580
- [49] Schütte L. Digitale Selbsthilfe. Digitalisierungs- und Technologiereport Diabetes. 2019. Zugriff am 26.05.2019 unter https://www.dutreport.de/wp-content/uploads/2019/01/Selbsthilfe_Schuette.pdf
- [50] Staiano AE, Beyl RA, Guan W et al. Home-based exergaming among children with overweight/obesity: a randomized clinical trial. *Pediatr Obes* 2018; 13: 724–733
- [51] Cooper AR, Tibbitts B, England C et al. Potential of electric bicycles to improve the health of people with type 2 diabetes: a feasibility study. *Diabet Med* 2018; 35: 1279–1282
- [52] van der Berg JD, Stehouwer CD, Bosma H et al. Associations of total amount and patterns of sedentary behaviour with type 2 diabetes and the metabolic syndrome: The Maastricht Study. *Diabetologia* 2016; 59: 709–718
- [53] Dunstan DW, Dogra S, Carter SE et al. Sit less and move more for cardiovascular health: emerging insights and opportunities. *Nat Rev Cardiol* 2021; 18: 637–648. doi:10.1038/s41569-021-00547-y
- [54] Duvivier BM, Schaper NC, Hesselink MK et al. Breaking sitting with light activities vs structured exercise: a randomised crossover study demonstrating benefits for glycaemic control and insulin sensitivity in type 2 diabetes. *Diabetologia* 2017; 60: 490–498
- [55] Han HO, Lim J, Viskochil R et al. Pilot study of impact of a pedal desk on postprandial responses in sedentary workers. *Med Sci Sports Exerc* 2018; 50: 2156–2163. doi:10.1249/MSS.0000000000001679
- [56] Karstoft K, Winding K, Knudsen SH et al. The effects of free-living interval walking training on glycemic control, body composition, and physical fitness in type 2 diabetic patients: a randomized, controlled trial. *Diabetes Care* 2013; 36: 228–236. doi:10.2337/dc12-0658
- [57] Yang Z, Scott AC, Mao C et al. Resistance exercise versus aerobic exercise for type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Sports Med* 2014; 44: 487–499. doi:10.1007/s40279-013-0128-8
- [58] van Buuren F, Horstkotte D, Mellwig KP et al. Electrical myostimulation (EMS) improves glucose metabolism and oxygen uptake in type 2 diabetes mellitus patients – results from the EMS study. *Diabetes Technol Ther* 2015; 17: 413–419
- [59] Robinson CC, Barreto RP, Sbruzzi G et al. The effects of whole body vibration in patients with type 2 diabetes: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. *Braz J Phys Ther* 2016; 20: 4–14
- [60] Kempf K, Martin S. Autonomous exercise game use improves metabolic control and quality of life in type 2 diabetes patients – a randomized controlled trial. *BMC Endocr Disord* 2013; 13: 57. doi:10.1186/1472-6823-13-57
- [61] Baskerville R, Ricci-Cabello I, Roberts N et al. Impact of accelerometer and pedometer use on physical activity and glycaemic control in people with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Diabet Med* 2017; 5: 612–620