

Erreger	Impfung							Impfschema	Auffrischung	Hinweise
	Ab 18 J.	Ab 30 J.	Ab 40 J.	Ab 50 J.	Ab 60 J.	Ab 70 J.	Ab 80 J.			
Tetanus	Auffrischung alle 10 Jahre							1x	Alle 10 J.	Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap-Impfung
Diphtherie	Auffrischung alle 10 Jahre									
Pertussis	Auffrischung alle 10 Jahre bzw. bei Kontakt zu Neugeborenen oder Personal im Gesundheitsdienst/ Gemeinschaftseinrichtungen									
Poliomyelitis	ggf. Auffrischung, falls nicht im Kindes- und Jugendalter erfolgt							1x	Einmalig	IPV-Vakzin
Pneumokokken	Indikationsimpfung							1x	Keine Daten	PCV20 ^c
Influenza	Indikationsimpfung ^p							1x	Jährlich	ab > 60 J.: Hochdosisvakzin (ab Saison 25/26 auch adjuvantiertes Vakzin)
COVID-19	Basisimmunität und jährliche Auffrischung							BI: 3x ^c / 0 - 4-12 Wo. - 6 Mon.	Jährlich	
Herpes zoster	Indikationsimpfung							2x / 0 - 2 (bis 6) Mon.	Einmalig	ab > 50 J.: Totimpfstoff ^d
Hepatitis B	Indikationsimpfung (chronische Nierenkrankheit)							2 - 3x / 0 - 1 - (6) Mon.	Nach Bedarf (anti-HBsAg < 100 IE/l)	Impfen bei Immundefizienz, Prädialyse, Dialyse Serologische Kontrolle 4 - 8 Wo. nach jeder Auffrischung
FSME	Indikationsimpfung							3x	Alle 3 J. (5 J.) ^e	FI beachten
RSV	Indikationsimpfung							1x	Einmalig	ab > 60 J. mit (vaskulären) Komplikationen